BULLETIN FOURRAGE

n° 12 – 13 mai 2020

Après un épisode de chaleur la semaine dernière, la pluie est de retour et les températures ont baissé. Les 1100°C sont atteints en zone de basse altitude (<500m) : il sera temps de démarrer les foins, dès que la météo sera favorable.

Données météo

10 mai 2020	Altitude (m)	Précipitations (mm) du 4-mai	au 10-mai	30 derniers jours	Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour) 2020	2019	année moy	Foin fibreux prairie très précoce 900 °j	Foin de qualité prairies précoces 1100 °j	Foin fibreux prairie précoce 1200 °j	1300 °j
St-Girons	414 m	**13 mm**		**180 mm**	**1135°**	996	939	25-avr	7-mai	14-mai	21-mai
Cos	519 m	**21 mm**		**127 mm**	**1080°**	969	850	29-avr	11-mai	18-mai	25-mai
Leran-Lourmatel	391 m	**26 mm**		**138 mm**	**1078°**	930	884	29-avr	11-mai	16-mai	23-mai
Montaut	295 m	**17 mm**		**121 mm**	**1196°**	1077	905	22-avr	4-mai	10-mai	17-mai
Mazères Le Massuet	223 m	**20 mm**		**83 mm**	**1178°**	181	-	23-avr	5-mai	11-mai	19-mai

Altitude :

Simulation 600m	**1001°**
Simulation 800m	**844°**
Simulation 1000m	**687°**

La semaine passée a été chaude et le soleil était au rendez-vous : les températures moyennes ont oscillé entre 18°C et 20°C. Un maximum de 30°C a été enregistré à Saint-Girons le lundi 4 mai.

Comme prévu, la pluie a fait son retour au cours du week-end ce qui s'est accompagné d'une baisse des températures moyennes d'environ 3°C. Côté Est du département, la pluie est tombée à partir de dimanche 10 mai : 25mm à Léran, 20mm à Mazères et 17mm à Montaut. Côté Ouest, 2 à 3mm sont tombés le samedi 9 mai puis respectivement 18 et 11mm à Cos et Saint-Girons le lendemain.

Côté somme de températures, les 1100°j ont été atteints ou sont sur le point de l'être pour les 5 stations de basse altitude.

La pluie sera toujours de mise cette semaine et en début de semaine prochaine. Les températures moyennes se maintiendront autour des 15°C.

Repères en sommes de températures :

	Fin déprimage	Ensilage, enrubanné, séchage en grange	Foin de bonne valeur alimentaire	Foin fibreux
Prairie temporaire	500 °C jour	800 °C jour	1000 °C jour	1200 °C jour
Prairie permanente fertile et précoce	500 °C jour	900 °C jour	1100 °C jour	1300 °C jour
Prairie permanente plus tardive	800 °C jour	1000 °C jour	1200 °C jour	1600 °C jour

Prévisions Météo :

mer 13	jeu 14	ven 15	sam 16	dim 17	lun 18	mar 19
9°C / 19°C	10°C / 17°C	10°C / 17°C	10°C / 18°C	11°C / 20°C	12°C / 21°C	12°C / 21°C
5,3 mm	8 mm	22,6 mm	8,1 mm	6,7 mm	12,3 mm	4,9 mm

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 12 mai 2020)

Conseils de la semaine

Les 1200°j seront atteints dans la semaine. Cependant, la météo ne semble pas favorable à la réalisation du foin. Il faut rester à l'affut des fenêtres de beau temps et tenir compte des conditions de portance des sols.

Le deuxième tour de pâturage doit se terminer. En fonction de l'avancement de l'herbe sur les prochains parcs, il est toujours possible de débrayer des parcelles (au-delà de 15 jours d'avance; méthode de calcul disponible dans le bulletin fourrage n°6).

A 600m d'altitude, les chantiers d'ensilage/enrubannage peuvent s'organiser sur les prairies tardives (1000°Cj). Le deuxième tour de pâturage doit être entamé.

Sur les exploitations de 800m, en fonction de la météo, les chantiers d'ensilage/enrubannage sur prairies précoces peuvent démarrer (800-900°Cj).

Suivi de l'exploitation de Montégut-Plantaurel

L'éleveur :

> Après la fin du premier tour, les animaux sont allés sur la parcelle parking, un bois pâturé de 4ha. Avec le manque d'eau, la pousse de l'herbe au stade 3 feuilles n'était pas atteinte.
>
> La pluie abondante du mois d'avril a permis une forte croissance de l'herbe. Le retour des animaux sur le parcellaire a eu lieu dès que la portance du sol l'a permis : le 25 avril.
>
> Au vu des mesures de hauteur d'herbe réalisées le 4 mai, j'ai 14 jours d'avance ce qui est optimum pour bien gérer le pâturage avec 35 ares de surface de base/UGB. Je ne vais donc pas faire de retrait de parc.
>
> Je vais finir mon second tour autour du 13 mai.

Les animaux pâturant sur le parc 8

Observations :

La flore du parcellaire est très hétérogène. Dans certains endroits des parcs, on observe une dominance de la fétuque élevé et du dactyle naturels au stade épiaison alors que pour d'autres, le tapis végétatif est plus tendre mais pas suffisamment dense.
Du fait de cette hétérogénéité, les animaux surpâturent les zones où l'herbe est plus tendre au stade 3 feuilles et à délaissent les zones de fétuque ce qui explique le développement de mousse.

Remarque :

Si l'épi est coupé lors du pâturage, la repousse sera feuillue (= étêtage). Cet épi est accessible par l'animal au stade début montaison, lorsque l'épi (encore dans la gaine) se situe entre 5 et 20 cm.

Au-delà de 20 cm, les animaux refusent de consommer l'épi ce qui est le cas pour la fétuque et le dactyle.

Conseils :

Sur un parc où la fétuque domine par endroits, faucher la veille de l'entrée des animaux (avec le beau temps) pour améliorer la consommation de cette fétuque.

La fauche des refus peut apparaître utile à partir du troisième tour avec une proportion de refus relativement faible. Il s'agit de couper les orties dans les zones de couchage ou les épis peu appétents comme la flouve odorante, le brome sauvage ou encore la fétuque et le dactyle naturels comme sur le parcellaire suivi.

L'utilisation d'une simple faucheuse à assiettes effectuant une coupe franche ou d'un broyeur à prairie favorise une meilleure repousse.

Le système d'abreuvement

Action financée par:

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «développement agricole et rural»

Contact : estelle.dubarry@ariege.chambagri.fr / patrick.beral@ariege.chambagri.fr

Les préconisations issues de ce bulletin découlent :

- *des données météo France sur 5 stations du département*
- *des mesures de la pousse de l'herbe faites sur l'exploitation suivie*

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambre-agriculture.fr