BULLETIN FOURRAGE

n° 15 – 8 juin 2022

Les bulletins fourrages publiés chaque semaine par la Chambre d'agriculture présentent l'évolution de la pousse de l'herbe grâce aux « sommes de températures » calculées à partir de 7 stations météo réparties sur le département.

Données météo

5 juin 2022	Altitude (m)	Précipitations (mm) du 30-mai au 5-juin	Précipitations (mm) 30 derniers jours	Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour) 2022	Somme de températures 2021	Foin fibreux prairie très précoce 900 °j	Foin de qualité prairies précoces 1100 °j	Foin fibreux prairie précoce 1200 °j	Foin de qualité prairies tardives 1500 °j	Foin fibreux prairie tardive 1600 °j
St-Girons	414 m	8 mm	41 mm	1430°	1355	4-mai	16-mai	22-mai	8-juin	14-juin
Cos	519 m	1 mm	18 mm	1401°	1300	6-mai	18-mai	24-mai	10-juin	16-juin
Leran-Lourmatel	391 m	0 mm	13 mm	1412°	1308	6-mai	17-mai	23-mai	9-juin	15-juin
Montaut	295 m	0 mm	9 mm	1530°	1446	29-avr	11-mai	17-mai	3-juin	8-juin
Mirepoix	293 m	1 mm	8 mm	1485°						
Serres sur Arget	548 m	1 mm	16 mm	1327°						
Prades	1535 m	15 mm	56 mm	803°						

Prévisions Météo

Mar 07	Mer 08	Jeu 09	Ven 10	Sam 11	Dim 12	Lun 13	Mar 14	Mer 15	Jeu 16	Ven 17	Sam 18
14° 21°	13° 22°	14° 21°	10° 26°	9° 30°	12° 34°	19° 37°	20° 36°	17° 33°	12° 33°	13° 26°	12° 32°

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 06/06/2022)

Zoom sur les sommes de températures du moment

	Ensilage, enrubanné, séchage en grange	Foin de bonne valeur alimentaire	Foin fibreux
Prairie temporaire	800 °C jour	1000 °C jour	1200 °C jour
Prairie permanente fertile et précoce	900 °C jour	1100 °C jour	1300 °C jour
Prairie permanente plus tardive	1000 °C jour	1200 °C jour	1600 °C jour

Conseil de la semaine

Dernière ligne droite pour faire des foins fibreux !

Au-delà de 1400°jours la valeur alimentaire des foins devient médiocre. Il faut profiter du beau temps annoncé pour cette fin de semaine pour finaliser les chantiers de foins.

A partir de maintenant, **au-delà de 1500°c jours les stades de l'herbe ne sont plus influencés par les sommes de températures,** sauf sur les exploitations à plus de 1000 m d'altitude pour la récolte des foins jusqu'à fin juin. Par conséquent, les informations des sommes de températures ne figureront plus dans les prochains bulletins.

La pousse de l'herbe va être plus conditionnée par les conditions de pluviométrie et chaleur !

En été, redécouper pour optimiser la gestion du pâturage

Si la surface de pâturage augmente avec l'introduction des repousses des prairies des fauches précoces, **le pâturage estival obéit lui aussi à certaines règles :**

- **Redécouper les parcelles** de fauches pour avoir un temps de séjour optimal de 2 à 3 jours sans dépasser 7 jours

- **Respecter une hauteur d'herbe** en sortie de parcelle de 5 cm (facilite la repousse et préserve la prairie)

- **Revenir pacager tous les 30 à 40 jours.** La feuilles du dactyle et fétuque ont un cycle de vie de 800°C, il faut donc revenir (en été) au bout de 40 jours pour ne pas perdre de l'herbe par sénescence.

- **Avec une gestion au fil, ne pas oublier le fil de recul**

Action financée par:

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Liberté Égalité Fraternité

Contact : patrick.beral@ariege.chambagri.fr / pierre-damien.bascou@ariege.chambagri.fr

Les préconisations issues de ce bulletin découlent :

- *des données météo France sur 5 stations du département*
- *des mesures de la pousse de l'herbe faites sur l'exploitation suivie*

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambre-agriculture.fr

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE ARIÈGE