N°01 – 21 février 2023

BULLETIN FOURRAGE

Les bulletins fourrages publiés chaque semaine par la Chambre d'agriculture présentent l'évolution de la pousse de l'herbe grâce aux « sommes de températures » calculées à partir de 7 stations météo réparties sur le département.

DONNÉES MÉTÉO

19 février 2023	Altitude (m)	Précipitations (mm) Du 13/02 Au 19/02	30 derniers jours	Somme TBO depuis le 1er janvier **2023**	Somme de températures depuis le 1 février (°C-jour) **2023**	2022	année moy
St-Girons	414 m	0 mm	2 mm	**257°**	**108°**	159	103
Cos	391 m	0 mm	4 mm	**255°**	**112°**	158	108
Leran-Lourmatel	391 m	1 mm	7 mm	**233°**	**95°**	146	111
Montaut	295 m	1 mm	3 mm	**307°**	**132°**	166	110
Mirepoix	293 m	0 mm	4 mm	**252°**	**104°**		
Serres sur Arget	548 m	0 mm	1 mm	**212°**	**91°**		
Prades	1535 m	0 mm	10 mm	**129°**	**65°**		

PRÉVISIONS MÉTÉO



CONSEIL DE LA SEMAINE

Optimiser la pousse de l'herbe par la fertilisation azotée pour créer des stocks : c'est le bon moment dès le retour de la pluie.

Le seuil des 200° degrés-jour cumulés depuis le 1er février marque le démarrage de végétation pour la majorité des prairies.

L'apport d'azote sur les prairies doit se faire entre 200 et 350°degrés-jours cumulés à partir du 1er janvier en fonction du potentiel de la prairie. C'est à partir de ce moment que les plantes sont en capacité physiologique de le valoriser.

Au vue des sommes de température**, c'est le bon moment pour faire cet apport d'azote sur les prairies fertiles à base de ray-grass, dactyle, fétuque pour une récolte précoce.**

Cependant, l'absence de pluie depuis 30 jours en cette période hivernale avec des gelées matinales sont les principaux facteurs limitant de la pousse de l'herbe !!!

Il est **préférable d'avoir des conditions puissantes** (t° positives et humidité) pour valoriser au mieux l'apport d'azote.

Attendre la pluie, 10 à 15 mm après l'apport pour une disponibilité plus importante dans le sol et limiter les pertes par volatilisation.

Un apport de 30 à 40 unités d'azote sous forme d'ammonitrate assurera un bon démarrage de végétation. Au-delà il y a un risque de lessivage important en fonction de la pluviométrie.

Un apport de 13T/ha de fumier couvre **le besoin annuels en P et K des prairies fauchées puis pâturées.**

Sur **les prairies riches en légumineuses** attention à ne pas négliger les besoins en P et K.

Les apports de fumier sont encore possibles pour des récoltes envisagées au-delà de mi-mai, puisqu'un **délai de 3 mois est nécessaire après l'épandage et la première utilisation.**

Pour les lisiers, il faut attendre **au moins 8 semaines avant la première exploitation de printemps** pour valoriser l'azote et ne pas souiller l'herbe.

En sortie d'hiver, il est peut-être conseillé d'étaupiner et d'ébouser sur les prairies de fauches pour assurer une bonne **qualité des fourrages récoltés.**

Etaler les bouses et les taupinières nécessite des lames, des raclettes ou des socs. Un matériel « fait-maison » avec un train de pneus ébouse parfaitement.

N°01– 21 février 2023

RAPPEL :

Il faut respecter un repos **hivernal de deux mois** sur toutes les prairies.

PROCHAINE ÉTAPE :

Mise à l'herbe à 300° jour sur la base du 1er février

patrick.beral@ariege.chambagri.fr / tara.bate@ariege.chambagri.fr

Les préconisations issues de ce bulletin découlent :
- des données météo France sur 5 stations du département
- des mesures de la pousse de l'herbe faites sur l'exploitation suivie

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :

www.ariege.chambre-agriculture.fr

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
CHAMBRE D'AGRICULTURE
PROAGRI