PROaGRI
POUR VOUS, AUJOURD'HUI, ET DEMAIN

N° 10
25 avril 2023

BULLETIN FOURRAGE

Les bulletins fourrages publiés chaque semaine par la Chambre d'agriculture présentent l'évolution de la pousse de l'herbe grâce aux « sommes de températures » calculées à partir de 7 stations météo réparties sur le département.

patrick.beral@ariege.chambagri.fr / tara.bate@ariege.chambagri.fr

Les préconisations issues de ce bulletin découlent :
- des données météo France sur 5 stations du département
- des mesures de la pousse de l'herbe faites sur l'exploitation suivie

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambre-agriculture.fr

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Liberté Égalité Fraternité
CHAMBRE D'AGRICULTURE ARIÈGE
PROaGRI POUR VOUS, AUJOURD'HUI, ET DEMAIN

Données météo

23 avril 2023	Altitude (m)	Précipitations (mm) du 17-avr.	au 23-avr.	30 derniers jours	Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour) 2023	2022	année moy	Fin déprimage prairies précoces 500 °j	prairies tardives 800 °j	ensilage-enrubanné prairies très précoces 700 °j	Fin 1er tour de pâture 750 °j	ensilage-enrubanné prairies précoces 800 °j
St-Girons	414 m	7 mm		44 mm	744°	745	701	31-mars	27-avr	19-avr	23-avr	27-avr
Cos	519 m	6 mm		80 mm	742°	715	634	31-mars	27-avr	19-avr	23-avr	27-avr
Leran-Lourmatel	391 m	9 mm		79 mm	682°	714	660	6-avr	1-mai	24-avr	28-avr	1-mai
Montaut	295 m	6 mm		61 mm	805°	808	672	28-mars	22-avr	15-avr	19-avr	22-avr
Mirepoix	293 m	4 mm		38 mm	727°							
Serres sur Arget	548 m	7 mm		114 mm	671°							
Prades	1535 m	11 mm		58 mm	394°							

Prévisions météo



Zoom sur les sommes de températures du moment

	Fin déprimage	Ensilage, enrubanné, séchage en grange
Prairie temporaire	500 °Cjour	700 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	500 °Cjour	800 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	800 °Cjour	1000 °Cjour

Conseils de la semaine

Des matinées fraiches, des gelées sur certains secteurs notamment en altitude avec une faible pluviométrie ne permettent pas une optimisation de la pousse de l'herbe.

La semaine à venir, le repère 800° c jour base 1er févier va être dépassé et annonce le début des ensilages des prairies permanentes précoces. Ce repère de température traduit le début épiaison des graminées qui conservent une bonne valeur alimentaire pour faire des stocks de qualités.

En plaine avec l'explosion de l'herbe**, la gestion du pâturage est plus que d'actualité** surtout avec le retour de la pluie et des températures plus douces annoncée.

Les ensilages de RGI se poursuivent en fonction des objectifs de qualité.

Nom	Ensilage herbe riche	Ensilage équilibré	Ensilage vision quantité
Stade et somme de températures (° jour)	Epi 10 cm 550	Epi 20-25 cm 650	Début épiaison 750
Rendement (t MS/ha)	3	4	5
UFL (par kg MS)	0,94	0,88	0,82
MAT (g/kg MS)	160	160	130

Sur les exploitations vers 1000 m d'altitude, à 550°c jours il faut se concentrer sur la gestion du pâturage sur la surface de base et arrêter le déprimage.

Vers les 1500 m d'altitude, il est toujours possible de déprimer les surfaces de fauche.

Gestion pâturage :

Avec des hivers doux favorables à la pousse de l'herbe, certains, on fait du pâturage hivernal sans oublier de respecter deux mois de repos hivernal, d'autre malgré une sortie à l'herbe de bonne heure sont confrontés en période de pleine pousse de l'herbe à des refus qui montent en épi !

➢ Que faire ? : du topping

Le topping consiste à faucher la parcelle juste avant d'y mettre les animaux. Il permet d'éviter le sur-pâturage des zones sans refus tout en bénéficiant d'une repousse plus homogène le tour suivant. L'herbe au sol est moins triée par les animaux. Il permet de gérer les adventices avant la montée en graine (rumex, chardons…). **Il doit être occasionnel sur certains parcs** afin de limiter le coût de pâturage. Un recours trop fréquent est signe d'une amélioration du pâturage à prévoir. (surface de base trop importante, pas suffisante, de pression de pâturage avec des parcs trop grand)

➢ Quand le faire ?

Faucher par beau temps à une hauteur de 6/7 cm afin d'éviter un ébousage qui réduirait l'appétence de l'herbe, de préférence l'après-midi, car l'herbe est plus riche en sucre donc plus appètent. Laisser sécher 6 h avant de mettre les animaux. Ils consomment 80 à 90 % de ce qui est fauchés.

➢ Topping ou débrayage ?

Le topping permet de gérer la qualité de l'herbe pâturée sur la parcelle, **mais on ne gère pas ici l'excédent** de pousse puisque les animaux pâturent la parcelle.

Avec un parc à une hauteur d'herbe de 15/18 cm, hauteur de botte mi- mollet, il doit être débrayé. Avec des sommes de température autour de 750°c jour, l'épi est à une hauteur de 20 cm dans la gaine, l'herbe perd de l'appétence et les refus sont importants !!!

Il vaut mieux enrubanner un parc à plus de 15/18 cm dès que possible pour favoriser une repousse rapide et faire revenir ce parc dans le tour de pâturage dans 21/25 jours.

Faire un tour des parcs pour évaluer la hauteur d'herbe avec la botte et prévoir un tour de pâturage de l'ordre de 21 jours minimum avec le ou les parcs débrayés.



patrick.beral@ariege.chambagri.fr / tara.bate@ariege.chambagri.fr

Les préconisations issues de ce bulletin découlent :
- des données météo France sur 5 stations du département
- des mesures de la pousse de l'herbe faites sur l'exploitation suivie

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :

www.ariege.chambre-agriculture.fr

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Liberté Égalité Fraternité
CHAMBRE D'AGRICULTURE ARIÈGE
PROAGRI POUR VOUS, AUJOURD'HUI, ET DEMAIN