BULLETIN FOURRAGE

n° 4 – 15 mars 2022

Les bulletins fourrages publiés chaque semaine par la Chambre d'agriculture présentent l'évolution de la pousse de l'herbe grâce aux « sommes de températures » calculées à partir de 7 stations météo réparties sur le département.

Données météo

13 mars 2022	Altitude (m)	Précipitations (mm) du 7-mars au 13-mars	Précipitations (mm) 30 derniers jours	Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour) 2022	2021	année moy	cumul obtenu en année moy. le	cumul obtenu en 2021 le	Mise à l'herbe prairies TP / RGI 250 °j	prairies précoces 300 °j	prairies tardives 400 °j	Fin déprimage prairies précoces 500 °j	prairies tardives 800 °j
St-Girons	414 m	18 mm	69 mm	329°	371	268	19-mars	8-mars	2-mars	9-mars	23-mars	31-mars	29-avr
Cos	519 m	19 mm	64 mm	319°	358	255	20-mars	8-mars	3-mars	10-mars	24-mars	1-avr	2-mai
Leran-Lourmatel	391 m	22 mm	48 mm	306°	320	264	17-mars	11-mars	5-mars	12-mars	25-mars	3-avr	5-mai
Montaut	295 m	14 mm	41 mm	358°	390	266	22-mars	9-mars	28-févr.	6-mars	17-mars	28-mars	24-avr
Mirepoix	293 m	17 mm	65 mm	335°									
Serres sur Arget	548 m	26 mm	86 mm	289°									
Prades	1535 m	21 mm	66 mm	117°									

Prévisions Météo

MER 16	JEU 17	VEN 18	SAM 19	DIM 20	LUN 21	MAR 22
10 ° / 18 °	8 ° / 12 °	8 ° / 10 °	7 ° / 15 °	7 ° / 14 °	6 ° / 16 °	9 ° / 14 °

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 15/03/2022)

Zoom sur les sommes de températures du moment

	Mise à l'herbe	Fin déprimage
Prairie temporaire	250 °C jour	500 °C jour
Prairie permanente fertile et précoce	300 °C jour	500 °C jour
Prairie permanente plus tardive	400 °C jour	800 °C jour

Conseil de la semaine

Une année équivalente à celle de l'an passé en cumul de somme de température 300°c jour mais plus précoce à une année moyenne de 10 jours !!!

Avec des conditions météo plus favorables à celle de l'an passé, **la mise à l'herbe des premiers lots d'animaux doit se poursuivre en fonction de la portance des sols** sur les prairies fertiles et précoces.

Tourner rapidement sur votre surface de base.

Il faut avoir l'impression **«de courir» après l'herbe** pour réussir votre saison de pâturage.

Avec une pousse plus faible au début de printemps, si vous manquez d'herbe, il est possible d'aller **déprimer les surfaces de fauches jusqu'à 500°c jour**, soit vers fin mars - début avril, **afin de gagner des jours de pâturage** et respecter un temps de retour de 21 jours minimum.

Comprendre la notion de déprimage et d'étêtage

	Déprimage	Etêtage
Définition	Le futur épi n'est pas coupé par la pâture	Le futur épi est coupé par la pâture
Impact sur la repousse	**Repousse reproductive** ➢ Epiaison décalée d'une semaine ➢ La tige repousse moins haute ➢ Production plus importante de feuilles ➢ Augmentation de l'appétence	**Repousse végétative** ➢ Allongement de la tige au fur et à mesure de la montée de l'épi Adapté pour les espèces non remontantes c'est-à-dire qui ne referont pas un épi : RGA, dactyle, fétuques,… C'est le cas pour la plupart des espèces pâturées à l'exception des RGI, RGH et brome.
Intérêts	✓ Favoriser le tallage (densification) et l'appétence ✓ Optimiser la qualité de foin récolté (moindres pertes en quantité)	✓ Favoriser les repousses feuillues ✓ Donner la priorité à la qualité de foin (pertes en quantité)

Remarque:

On peut aller **déprimer les parcelles de fauches fertiles et précoces** (surface complémentaire) **jusqu'à 500°cj**. Au-delà de 500°cj, on pratique un étêtage de la majorité des graminées qui va entrainer une perte de rendement important jusqu'à 50% au profit de la qualité.

Par contre il est important de bien **étêter la surface de base** (surface de pâturage) **pour favoriser une pousse de l'herbe feuillue**. Une sortie à l'herbe tardive sur des prairies précoces limitera l'étêtage de certains parcs, avec une montée en épi et un gaspillage d'herbe important et une baisse de la valeur alimentaire!!!! Cela nécessitera un débrayage avec une fauche précoce de ces parcs pour un retour rapide dans le tour du pâturage.



Sortir ses animaux au bon moment
= réussite de l'étêtage de la surface de base
= maîtrise du pâturage au stade feuillu
= bonne valeur alimentaire
= gains en croissance et coûts

Action financée par:

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Liberté Égalité Fraternité

Contact : patrick.beral@ariege.chambagri.fr / pierre-damien.bascou@ariege.chambagri.fr

Les préconisations issues de ce bulletin découlent :
- *des données météo France sur 5 stations du département*
- *des mesures de la pousse de l'herbe faites sur l'exploitation suivie*

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambre-agriculture.fr

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE ARIÈGE