N°3 – 19 avril 2019

• Données météo (Météo France) :

Données du **14-avr.**	Précipitations du 8-avr. au 14-avr.	Précipitations 30 derniers jours	Cumuls températures * 2019	écart par rapport à 2018	Dates prévisionnelles – Fin déprimage – prairies précoces	Dates prévisionnelles – Fin déprimage – prairies tardives	Dates prévisionnelles – Ensilage ou enrubannage de haute qualité (début épiaison) prairies précoces	Dates prévisionnelles – Ensilage ou enrubannage de haute qualité (début épiaison) prairies précoces
Stations météo :					500 °j	800 °j	800 °j	900 °j
St-Girons (414m)	18 mm	60 mm	**659 °j**	-8 jours	27-mars	26-avr.	26-avr.	4-mai
Cos (519m)	15 mm	47 mm	**644 °j**	-11 jours	28-mars	28-avr.	28-avr.	6-mai
Leran-Lourmatel (391m)	31 mm	58 mm	**599 °j**	-6 jours	2-avr.	1-mai	1-mai	9-mai
Montaut (295m)	26 mm	52 mm	**722 °j**	-10 jours	23-mars	21-avr.	21-avr.	29-avr.

*cumul temp. moyennes journalières depuis 1er février. Prévisions : à partir valeurs moyennes sur 20 à 30 ans

• Ajustements en fonction de l'altitude au 14 avril

+ 100m	+ 200m	+ 300m	+ 400m	+ 500m	+ 600m	+ 700m	+ 800m
-43°Cjour	-86°Cjour	-130°Cjour	-173°Cjour	-216°Cjour	-259°Cjour	-302°Cjour	-346°Cjour

0,6 °C en moins par jour et par tranche de 100 m en plus par rapport à la station de référence

Retirez 43° jour si vous êtes situés 100m AU-DESSUS de la station (ajoutez-les si vous êtes 100m plus bas, sauf pour une parcelle en bas-fond). Par exemple, si vous êtes situés à 800m d'altitude et que vous utilisez la station météo de St-Girons, vous êtes à+400m, la somme de température pour chez vous est de 659-173 = 486°Cjour.

. Prévisions : douceur mais nouvelle période pluvieuse



Prévisions Météo France pour Foix (au 18/04)

• Conseils de la semaine

- La mise à l'herbe devrait pouvoir être faite jusque vers 1200m sur prairies précoces (1000 m sur prairies plus tardives), sous réserve que les parcelles restent portantes. Avec le radoucissement annoncé et des sols humides, la pousse de l'herbe devrait s'accélérer : commencer à faire pâturer dès qu'il y a plus de 7-8 cm d'herbe (à la cheville) permettra de mieux maîtriser cette accélération et d'éviter de faire pâturer dans quelques semaines de l'herbe trop âgée avec une valeur alimentaire dégradée.

- Le déprimage est à cesser sur les prairies précoces, sauf zones à plus de 800-900m d'altitude) : risque élevé d'avoir une forte perte de rendement en foin (grande quantité d'épis coupés).
- Les parcelles précoces, notamment les ray-grass italiens, approchent de l'épiaison : tenez-vous prêts à ensiler ou enrubanner dès la prochaine période de 2-3 jours de beau temps pour récolter un fourrage de qualité.

Zoom sur…

❖ Ensilages et enrubannages : les points-clé

✓ Faucher au bon stade, en fonction de l'utilisation prévue

A partir du stade début-épiaison (10% de plantes épiées) les valeurs énergétiques et azotées baissent rapidement alors que le rendement progresse peu.



Valeur alimentaire d'un ensilage préfané de ray-grass italien selon le stade de fauche (d'après INRA 2007)

- Une fauche au **début de l'épiaison** convient pour une utilisation par des vaches allaitantes, en fourrage principal ou associé à un foin de bonne valeur (foin précoce)
- Une fauche **avant le début de l'épiaison** est intéressante pour des vaches laitières en complément d'ensilage de maïs, pour des allaitantes en association avec un foin de moins bonne qualité, ou bien en fourrage principal pour des génisses de renouvellement : la complémentation à apporter en céréales et tourteaux sera réduite.
- Si plusieurs exploitations sont prévues, une fauche précoce permettra souvent de meilleures conditions de repousse.

✓ Ne pas couper trop ras : 7 cm

Intérêts : moins de risque de terre dans le fourrage, séchage plus facile (meilleure circulation d'air sous l'andain), meilleure valeur alimentaire notamment azotée, **repousse plus rapide** grâce à la présence de feuilles vertes et moins de dessèchement du sol.

✓ Faciliter un séchage rapide : atteindre le plus rapidement possible 30-35% de matière sèche pour un ensilage, 45-50% pour un enrubannage

Objectif : limiter la perte de valeur alimentaire (consommation des sucres par la plante)

- **Faucher en fin de matinée** après la rosée ou tout début d'après midi.
- Maximiser la surface d'exposition au soleil : **andains larges** (80% de la surface de fauche) **ou fanage sitôt la fauche**
- Prévoir **48 h de séchage pour un ensilage**, **3-4 jours pour un enrubannage**.
- Prévoir un **temps de séchage plus long pour les associations riches en légumineuses** (trèfles, vesce…), en raison d'une teneur en eau plus élevée.

en tordant une poignée du jus s'écoule	25-(30) %MS
en tordant une poignée les mains sont mouillées (quelques gouttes)	30-(35) MS
Même une forte torsion laisse les mains sèches	40% MS et plus
Le fourrage est souple mais devient mat comme foin	50% MS

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT
Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «développement agricole et rural»

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE ARIÈGE